

Регламенты применения

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Норма расхода, л, кг/га	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработки)
Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в металлических силосах, оборудованных системой рециркуляции газовой смеси	Насекомые-вредители запасов	9г/т	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, зерна - выше 15° С с использованием технологии рециркуляции газовой смеси через зерновую массу внутри силоса при полной его загрузке зерном. Раскладка таблеток в генератор фосфина, установленный за пределами силоса. Экспозиция 5 суток. ПКЭ – 7 г·ч/м ³ для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г·ч/м ³ для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК	-(-)
Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой				-(-)
Незагруженные зернохранилища		5г/м ³		-(-)
Зерноперерабатывающие предприятия		6г/м ³		-(-)