



## สารกำจัดวัชพืช

**“ประหยัดเวลา กำจัดหญ้าได้ตั้งใจ  
กำจัดวัชพืชประเภทกกและใบกว้างโดยเฉพาะ”**

ชื่อสามัญ	2,4-ดี-ไตรไอโซโพรพานอลามีน ซอลต์ + พิกโคลแรม (2,4-D-triisopropanolamine salt) 45.2% + 11.6% SL
กลุ่มสารเคมี	Phenoxyacetic acid + Pyridinecarboxylic acid [กลุ่ม O]
จุดเด่น	โดแรม เป็นสารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอก โดแรม ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าไป ซึมเข้าสู่ลำต้นและลงสู่ราก โดแรม กำจัดวัชพืชตัวยาว ประเภทกกและใบกว้าง ในนาข้าว ข้าวโพด และอ้อย
ประโยชน์	สารกำจัดวัชพืชแบบดูดซึม ออกฤทธิ์ดีในดินชื้น กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนคางคก บานหยา กระดุมใบใหญ่ ผักปลาบไร่ สาบแร้งสาบกา ผักเสี้ยนผี ผักเบี้ยหิน ผักบุง ผักขม ปอวัชพืช ตดหมูตดหมา เถาเลื้อยและสะอึก วัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู หนวดปลาชุก กกขนาก และกกทราย
อัตราการใช้	ข้าว อายุ 30 วันขึ้นไป ใช้อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ข้าวโพด อายุ 30 - 40 วัน ใช้อัตรา 35 - 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ข้าวโพด อายุ 40 วันขึ้นไป ใช้อัตรา 50 - 80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร อ้อย ใช้อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร



ผักปอดนา



หนวดปลาชุก



กกขนาก



ผักเบี้ยหิน



หญ้าปากควาย

