

เรนโบว์ บิสไพริแบค โซเดียม 10% เอสซี

Rainbow Bispyribac-sodium 10% SC



สารกำจัดวัชพืช

“บาปลดหญ้า ข้าวปลอดภัย”

ชื่อสามัญ	บิสไพริแบค-โซเดียม (bispyribac-sodium) 10% SC
กลุ่มสารเคมี	Pyrimidinayloxybenzoic
จุดเด่น	เรนโบว์ บิสไพริแบค โซเดียม 10% เอสซี คือสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว เรนโบว์ บิสไพริแบค โซเดียม 10% เอสซี ฉีดจี้ ฉีดซ้ำได้ ข้าวไม่แดง ไม่จัน เรนโบว์ บิสไพริแบค โซเดียม 10% เอสซี ดุดซึมเข้าสู่ต้นวัชพืชได้ดีทางใบ หลังจากพ่นสาร 4-5 วัน วัชพืชจะเริ่มเหลือง และวัชพืชเริ่มตายภายในระยะ 15-20 วัน
ประโยชน์	ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาชุก และกกขนาก
อัตราการใช้	ข้าวอายุ 7-10 วัน หลังหว่านข้าว ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือใช้ 5 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ข้าวอายุ 15-20 วัน หลังหว่านข้าว ใช้อัตรา 40 มิลลิลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือใช้อัตรา 10 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน



ผักปอดนา



หญ้าดอกขาว



หญ้าข้าวนก



หญ้ากระดุกไก่

