



สารกำจัดแมลง

## “นิอคเริว ดุดซึมไว ออกฤทธิ์ยาวนาน”

ชื่อสามัญ	ไทอะมีโทกแซม (thiamethoxam) + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 14.1% + 10.6% ZC
กลุ่มสารเคมี	neonicotinoid + pyrethroid [กลุ่ม 4A+3A]
จุดเด่น	โคแลมบี คือสารกำจัดแมลงได้กว้างขวาง โคแลมบี ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึม ทั้งเพลี้ยและหนอนชนิดปากกัดและปากดูด โคแลมบี ปลอดภัยต่อพืชที่ปลูก

ประโยชน์ ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ได้หลากชนิดดังนี้

อัตราการใช้	อัตราการใช้ต่อหน้า 20 ลิตร		พ่นระยะสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยว	
	ชื่อศัตรูพืช	อัตราการใช้ (ซีซี)	ชื่อศัตรูพืช	ระยะเวลา (วัน)
	พริก	เพลี้ยไฟ	เพลี้ยไฟ	5 วัน
	กระเจียบเขียว	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย	3 วัน
	มะเขือยาว	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย	3 วัน
	มะเขือเทศ	หนอนเจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศ	หนอนเจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศ	7 วัน
	ถั่วเหลือง	แมลงหวี่ขาวยาสูบ	แมลงหวี่ขาวยาสูบ	3-5 วัน
	มะม่วง	เพลี้ยจักจั่นมะม่วง	เพลี้ยจักจั่นมะม่วง	3-5 วัน
	ส้มเขียวหวาน	เพลี้ยไก่แจ้ส้ม	เพลี้ยไก่แจ้ส้ม	28 วัน
	ทุเรียน	เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน	เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน	7 วัน
	ข้าว	หนอนห่อใบข้าว	หนอนห่อใบข้าว	30 วัน
	ผักกาดขาวปลีข้าว	หนอนเจาะยอดคะหล่ำ	หนอนเจาะยอดคะหล่ำ	14 วัน



เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน



แมลงหวี่ขาว



เพลี้ยไฟ



หนอนเจาะสมอฝ้าย

