



สารกำจัดวัชพืช

“ดูดซึมเร็วไว ปลอดภัยต่อต้นข้าว”

ชื่อสามัญ	ฟิโนซาพรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethyl) + เอทอกซีซัลฟูรอน (ethoxysulfuron) 6.9% + 2% W/V SC
กลุ่มสารเคมี	Aryloxyphenoxypropionate + Sulfonylurea [กลุ่ม A + B]
จุดเด่น	ไรซัน คือสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ไรซัน สามารถป้องกันและกำจัดวัชพืชในนาหว่านน้ำตม ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และกก ไรซัน ฉีดพ่น 10-15 วันหลังหว่าน เติ่ง่าย สะดวก
ประโยชน์	ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก และหนวดปลาตุ๊ก
อัตราการใช้	ใช้อัตรา 100-120 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 25-30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 15 วัน ก่อนพ่นสาร ให้ระบายน้ำออก และรดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน



กกขนาก



ผักปอดนา



หญ้าดอกขาว



หญ้าข้าวนก



หนวดปลาตุ๊ก

