

# กราซิดิม

Grasidim



สารกำจัดวัชพืช

## “ใช้น้อย ปลอดภัย ใหม่กว่า”

ชื่อสามัญ	คลีโทดิม (clethodim) 24% EC
กลุ่มสารเคมี	Cyclohexanedione Oxime [กลุ่มA]
จุดเด่น	กราซิดิม คือสารกำจัดวัชพืชใบแคบแบบเลือกทำลาย กราซิดิม ออกฤทธิ์ดูดซึม ปลอดภัยต่อพืชประธานใบกว้าง กราซิดิม กำจัดวัชพืชใบแคบได้ทั้งวัชพืชฤดูเดียว และวัชพืชข้ามปี
ประโยชน์	หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในถั่วเหลือง หอม กระเทียม พืชผัก มันสำปะหลัง เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก และหญ้าตีนติด
อัตราการใช้	ใช้อัตรา 80-120 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกพืชและวัชพืชมีจำนวน 3-5 ใบ



หญ้านกสีชมพู



หญ้าปากควาย



หญ้าตีนนก



หญ้าดอกขาว

